

Ibuprofeno Rospaw 400 VL Ibuprofeno 400 mg

Comprimidos
Industria Argentina – VENTA LIBRE

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento

¿QUE CONTIENE IBUPROFENO ROSPAW 400 VL?

Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 400 miligramos. (Como Ibuprofeno DC 90 444,44 mg; Ibuprofeno 400,00 mg; Celulosa microcristalina 2,24 mg; Almidón de maíz 24,44 mg; Dióxido de silicio coloidal 4,44 mg; Povidona K 30 4,44 mg; Ácido esteárico 2,22 mg; Croscarmelosa sódica 4,44 mg; Talco 2,22 mg).

ACCIÓN/ES

Calma el dolor, baja la fiebre, reduce la inflamación.

¿PARA QUÉ SE USA IBUPROFENO ROSPAW 400 VL?

Este medicamento está indicado para el alivio de dolores de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dentales, dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPROFENO ROSPAW 400 VL?

NO USE este medicamento si:

- Es alérgico al Ibuprofeno, aspirina, a otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 15 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- Es mayor a 65 años.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene presión arterial alta.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez) hígado, riñon o corazón.
- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte a su médico inmediatamente si:
– Experimenta alergias como erupción en la piel y picazón, que puede

acompañarse de dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua, garganta o cara.
– Experimenta empeoramiento de su asma.
– Este medicamento puede producir náuseas, acidez, dolor estomacal, síntomas en el tránsito intestinal. Si ocurre esto consulte a su médico y suspenda su uso.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200mg/día (3 comprimidos de 400mg)

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

No usar en niños menores de 15 años.

Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

No tomar por más de 5 días para el dolor ó 3 para la fiebre. Si los síntomas persisten o empeoran por mas de 48/72 horas consulte a su médico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel.: (011) 4962–6666/2247

Hospital Dr. Alejandro Posadas – Tel.: (011) 4654–6648 / 4658–7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451–5555

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico
Conservar en lugar seco a temperatura no superior a 30°C

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Llame al 4856–7400 o escribanos a info@rospaw.com

Fecha de última revisión: 07/2015

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 55318

Dirección Técnica: Marcelo Rizzo – Farmacéutico



Santos Dumont 4744 – Ciudad de Buenos Aires – Tel.: 4856–7400

1204570–1–1122