

14cm

PANTONE 302 C

MELATRIX

MELATONINA 3mg

Comprimidos recubiertos
Industria Argentina.
Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE MELATRIX?

Cada comprimido recubierto contiene:

Ingrediente activo: **Melatonina 3 miligramos.**

Ingredientes inactivos: lactosa monohidrato; celulosa microcristalina; croscarmelosa sódica; estearato de magnesio; dióxido de silicio coloidal; hidroxipropilmetilcelulosa; polietilenglicol; dióxido de titanio; azul brillante laca aluminica; amarillo de quinolina laca aluminica.

ACCION:

INDUCTOR DEL SUEÑO

¿PARA QUE SE USA MELATRIX?

Para el tratamiento de las alteraciones del sueño asociadas a viajes transmeridiano (Jet-lag), y en pacientes con dificultad para conciliar el sueño.

QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR MELATRIX?

NO USE este medicamento si usted sabe que es alérgico a la melatonina o a cualquier otro componente del medicamento.
NO USE este medicamento si padece aumento de la prolactina en sangre (hiperprolactinemia) de cualquier causa.
NO USE este medicamento en menores de 18 años.
NO USE este medicamento si padece intolerancia a la lactosa sin consultar antes con su médico.
NO USE este medicamento si padece alguna enfermedad autoinmune (Cuando el organismo es "atacado" por su propio sistema inmunitario).



QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Si Ud. tiene problemas de hígado o riñón comuníquese con su médico antes de tomar MELATRIX.

Si Ud. toma algún otro medicamento para dormir, comuníquese con su médico antes de tomar MELATRIX, ya que deberá discontinuar su administración de acuerdo a sus indicaciones, a fin de evitar la aparición de efectos adversos.

Si Ud. recibe otro medicamento, está embarazada, o está dando el pecho a su bebé, consulte con su médico antes de tomar MELATRIX.

Es probable que la mejoría no sea advertida hasta pasados unos días (e inclusive semanas) desde el comienzo del tratamiento con MELATRIX.

Se debe tener en cuenta que el insomnio puede ser ocasionado por múltiples factores. Consulte a su médico si los síntomas persisten o empeoran luego de 20 días de tratamiento.

El uso de este medicamento no ha demostrado ser eficaz en el tratamiento del insomnio crónico.

QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Si experimenta dolor de pecho, interrumpa el tratamiento con MELATRIX, y consulte a su médico.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos, consulte a su médico:

Irritabilidad, nerviosismo, insomnio, sueños anormales, pesadillas, dolor de cabeza, cansancio, falta de energía, mareos, presión sanguínea alta, dolor abdominal, sequedad de boca, náuseas, sudoración nocturna, inflamación de la piel, erupción de la piel, picazón, piel seca, dolor en las extremidades, trastornos de hígado.

Si experimenta algún síntoma que no aparece en este prospecto, consulte a su médico.

Conducción y uso de maquinarias:

MELATRIX puede causar somnolencia durante el día y/o excesivo cansancio, por lo que se deberá tener precaución en el manejo de automóviles y/o maquinaria peligrosa.

Si Ud. se encuentra recibiendo alguno de los medicamentos que se enuncian a continuación, consulte a su médico antes de tomar MELATRIX:

- Fluvoxamina (utilizada para el tratamiento de la depresión y del trastorno obsesivo compulsivo).
- Cimetidina (utilizada para tratar problemas estomacales).
- Quinolonas y rifampicina (utilizadas para el tratamiento de infecciones bacterianas).
- Estrógenos (utilizados como anticonceptivos o en la terapia de sustitución hormonal).
- Carbamazepina (utilizada para el tratamiento de la epilepsia).
- Agonistas y antagonistas adrenérgicos (utilizados para controlar la presión arterial, descongestivos nasales).
- Agonistas y antagonistas de los opioides (algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de las adicciones).
- Inhibidores de las prostaglandinas (como los antiinflamatorios no esteroideos).
- Antidepresivos y/o triptófano.
- Benzodiazepinas (tranquilizantes y/o ansiolíticos) e hipnóticos distintos de las benzodiazepinas (medicamentos utilizados para inducir el sueño).
- Psoralenos (drogas utilizadas para el tratamiento de enfermedades de la piel, como vitiligo y psoriasis).
- Tioridazina (utilizada para el tratamiento de la esquizofrenia).

COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Vía de administración: oral

En la prevención de alteraciones del sueño asociadas a viajes prolongados en avión (jet-lag) se aconseja 1 comprimido recubierto por la noche durante el viaje, comenzando 3 días antes del vuelo.

Como inductor del sueño, se aconseja 1 comprimido recubierto aproximadamente 2 horas antes del horario habitual del sueño.

Se debe tener en cuenta que el insomnio puede ser ocasionado por múltiples factores. Consulte a su médico si los síntomas persisten o empeoran luego de 20 días de tratamiento.

QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMO MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar mas cercano de asistencia médica:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital Fernández: (011) 4801-7767

Optativamente, otros Centros de Intoxicaciones.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Puede comunicarse con:

- Laboratorio Rospaw al (5411) 4856-7400

- ANMAT Responde al 0800-333-1234

MANTENGA LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

FORMA DE CONSERVACION:

Conservar a temperatura no mayor de 30°C y al abrigo de la luz.

PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 20 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Julio 2015

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°: 57.735

Dirección Técnica: Claudio G. Lamagna – Farmacéutico

LABORATORIO ROSPAW

Santos Dumont 4744 (1427), Ciudad de Buenos Aires

1204460-1-0116

15cm